

Alerta Epidemiológica VIGEPI /Ref. No.003-2017

A: Directores de Áreas de Salud y Hospitales
Epidemiólogos de Áreas de Salud y Hospitales

DE: Dra. Edeifi Judith García Sandoval
Jefa Departamento de Epidemiología-SIAS

Dra. Lorena Gobern,
Coordinadora Vigilancia Epidemiológica

Vo.Bo. Dr. Luis Enrique Castellanos López
Director General Sistema Integral de Atención en Salud-SIAS

ASUNTO: Alerta Epidemiológica por Brotes de Sarampión en Europa



Guatemala, 18 de abril de 2017

El Instituto de Salud Pública de Rumania informa que, al 10 de marzo, se han confirmado 3,446 casos de sarampión y 17 fallecimientos, desde el inicio del brote sarampión en septiembre de 2016. El Ministro de Salud rumano, Florian Bodog, ha confirmado que los fallecidos no estaban vacunados y que la cobertura de la vacunación frente al sarampión, en su país, era del 80 % para la primera dosis y de solo el 50 % para la segunda.

En Siria, la Red Mundial de Alerta y Respuesta a Brotes (GOARN) de la Organización Mundial de la Salud detectó en el mes de marzo 121 casos de esta enfermedad en los últimos dos meses, una cifra elevada si se compara con los 50 en total descubiertos en los últimos dos años.

En Guatemala el último caso autóctono de sarampión fue notificado en 1997 y no se ha tenido evidencia de importación del virus al país en los últimos 20 años, el principal indicador para la verificación de la no circulación del virus en el país del virus, es la notificación de al menos un sospechoso por municipio al año, para el año 2016 solamente el 25.3% (86/340) de los municipios del país notificaron sospechosos, hecho que evidencia riesgos importantes en la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad.

Las coberturas de vacunación con la primera dosis de SPR (sarampión, paperas y rubéola) desde 2008 (a excepción del año 2015) no han alcanzado con el porcentaje de 95% esperado para brindar una protección adecuada a la población infantil, en el 2014 fue el año con menos coberturas solamente se alcanzó el 67% de los niños de un año, lo que deja población infantil susceptible a estos virus.

Los bajos indicadores de vigilancia epidemiológica, bajas coberturas de vacunación con la vacuna SPR en los últimos años y la notificación de brotes en diferentes países ponen en riesgo al país de importación del virus de sarampión, en este contexto el Departamento de Epidemiología emite la siguiente Alerta Epidemiológica de observancia para todos los servicios de salud del país con los siguientes lineamientos

- 1) Intensificar y fortalecer la vigilancia de enfermedades febriles eruptivas, debido a los brotes notificados en otros países
 - a. Identificar pacientes sospechosos de sarampión o rubéola según la definición de caso de protocolo de vigilancia epidemiológica: persona de cualquier edad que presente fiebre y rash maculopapular o que el personal de salud sospeche de sarampión o rubéola.

En el momento de identificar sospechosos de Sarampión-Rubéola

- Llenar completamente la ficha epidemiológica y tomar en consideración la adecuada obtención, manejo, conservación y envío de muestras (Hisopado Nasofaríngeo, orina y serológico) al laboratorio y notificarlo al Departamento de Epidemiología
 - Completar la búsqueda activa de casos en la comunidad dentro de las 48 horas de notificar.
 - Elaborar un listado con datos generales, direcciones, teléfonos de contactos familiares, laborales, estudiantiles y sociales de todo caso febril eruptivo que se investigue.
- 2) Incrementar actividades de información, educación y comunicación en todas las áreas de salud, con énfasis en comunicación de riesgos.
 - 3) Vigilancia de Cadena de Frío
 - 4) Evaluación de las coberturas de vacunación con SPR 1 y SPR 2, planificar y ejecutar acciones para vacunación de población objetivo
 - 5) A personas residentes del país que viajaran a lugares con presencia de brotes actuales (Rumania, Italia y Siria) recomendar:
 - ✓ Vacunarse contra el sarampión y rubéola con la vacuna SR, idealmente al **menos dos semanas antes** de su partida. Hacer esfuerzos principalmente en las mujeres de edad fértil, para prevenir cualquier infección causada por el virus de la rubéola durante el embarazo.
 - ✓ Durante el viaje y al regresar estar atento a los siguientes síntomas: Fiebre, erupciones, tos, goteo nasal y conjuntivitis. Si presenta alguno de estos síntomas no salga de su domicilio, No viaje, no vaya al trabajo o escuela y contacte al servicio de salud más cercano informando antecedente de viaje y sintomatología presentada.

Para mayor información o dudas comunicarse con esta coordinación o con la Dra. Elisa Juárez, a los teléfonos 2471 0338 y 2445 4040 o al correo electrónico inmunopcne@gmail.com.

Atentamente