

MSPAS

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social



DIRECCIÓN DE
EPIDEMIOLOGÍA
Y GESTIÓN
DEL RIESGO



GOBIERNO *de*
GUATEMALA


MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA
Y ASISTENCIA
SOCIAL

Situación Epidemiológica de Leptospirosis 2023 hasta la semana 45 (finalizó 11 de noviembre)

Datos preliminares sujetos a cambios

**Departamento de Vigilancia y Control
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social**

Leptospirosis: muestras enviadas y positivas, Guatemala 2009-2023*



Fuente: LNS

*año 2023 a semana epidemiológica 45

Leptospirosis, casos confirmados por área de salud Guatemala 2022-2023 (semana 1-45)

	2022	2023
Escuintla	2	0
Guatemala Noroccidente	2	0
Quetzaltenango	2	0
Guatemala Central	1	0
Guatemala Sur	1	0
Total	8	0



Fuente: Laboratorio Nacional de Salud

Leptospirosis, muestras procesadas y positivas Guatemala país 2022-2023 (semana 1- 45)

año	Procesadas	positivas	Masc. positivas	Fem. positivas	% positividad
2022	216	8	3	5	3.7
2023	366	0	0	0	0

Fuente: Laboratorio Nacional de Salud


Leptospirosis, casos confirmados por área de salud Guatemala país 2022-2023 (semana 1-45)



Leptospirosis, muestras enviadas y positivas

Guatemala país 2022-2023

(Semana 1-45)



Fuente: Laboratorio Nacional de Salud

Leptospirosis, casos confirmados por año, edad y sexo
Guatemala país 2022-2023 (semana 1-45)

	2022		2023		
Edades (años)	M	F	M	F	Total
<1					
1 a 4					
5 a 9	1				1
10 a 14	2	2			4
15 a 19		2			2
20 a 24					
25 a 39		1			1
40 a 49					
50 a 59					
60 y más					
Totales	3	5	0	0	8

EPID

CCIÓN DE
MILOGÍA
ESTIÓN
RIESGO

CIENCIA AL SERVICIO



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA
Y ASISTENCIA
SOCIAL

CONCLUSIONES

A nivel nacional acumulado a la semana 45-2023 se evidencia disminución de 100% de casos de Leptospirosis comparado con el año 2022

Hasta la semana epidemiológica 45-2023 no se registran casos positivos

Al mismo periodo no se registra mortalidad por Leptospirosis

RECOMENDACIONES

Aplicar la definición de caso sospechoso de Leptospirosis establecida en los protocolos de vigilancia epidemiológica vigentes

Enviar segunda muestra 7-10 días después de la primera, para confirmar el diagnóstico serológico

Llenado correcto y completo de Ficha Epidemiológica de caso sospechoso de Leptospirosis en humanos

Ante la confirmación de un brote, implementar las medidas de contención y bloqueo establecidas en los protocolos de vigilancia

